

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

### ***Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki; uz ādas lietojams šķīdums RFF*** *Ammoniae solutio concentrata*

#### **Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto *Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki; uz ādas lietojams šķīdums RFF* (tālāk lietots zāļu nosaukuma saīsinājums "Amonjaka 10% šķīdums") rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc zāļu vienreizējas lietošanas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

#### **Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Amonjaka 10% šķīdums un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Amonjaka 10% šķīduma lietošanas
3. Kā lietot Amonjaka 10% šķīdumu
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Amonjaka 10% šķīdumu
6. Sīkāka informācija

#### **1. KAS IR AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**

Amonjaka 10% šķīdumu tautā sauc par ožamo spirtu. To lieto divējādi:

- ieelpošanai ģīboņa gadījumā, kad amonjaka tvaiki caur deguna gļotādas jušanas nerviem reflektori uzbudina elpošanas centru;
- ātri ādas dezinfekcijai kukaiņu koduma vietās.

#### **2. PIRMS AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMA LIETOŠANAS**

##### **Nelietojiet Amonjaka 10% šķīdumu šādos gadījumos**

- Ja ir zināma paaugstināta jutība pret amonjaka šķīdumu (t.i. zāles izsaukušas astmas lēkmi, nātreni, alerģiskas iesnas, tūsku).
- Izteiktu aknu darbības traucējumu gadījumā, jo tvaiku ieelpošana var izsaukt aknu komu.
- Ātri ādas slimību (iekaisusi āda, ekzēma) gadījumā un uz vaļējām brūcēm.
- Amonjaka 10% šķīdumu nelietot bērniem.

##### **Īpaša piesardzība, lietojot Amonjaka 10% šķīdumu, nepieciešama šādos gadījumos**

- Sevišķi uzmanīgi lietot slimniekiem ar radzenes slimībām, glaukomu, hroniskām elpošanas sistēmas slimībām, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.
- Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz citām gļotādām.

##### **Citu zāļu lietošana**

Nelietot vienlaicīgi ar stipriem oksidantiem, skābēm, sudraba un cinka sāļiem, jo amonjaks reaģē ar tiem.

### **Amonjaka 10% šķīduma lietošana kopā ar uzturu**

Amonjaka 10% šķīduma lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē.

### **Grūtniecība un zīdīšanas periods**

Ģīboņa gadījumā grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, zāles jālieto uzmanīgi, sevišķi ievērojot lietošanas ilgumu (0,5 – 1 sek.) un to, lai zīdāinis neieelpo amonjaka tvaikus.

Insekta koduma apstrādes gadījumā bīstamība nepastāv, jo caur veselu ādu zāles neuzsūcas.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Amonjaka 10% šķīdums, arīgi lietojot, neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

### **Svarīga informācija par kādu no Amonjaka 10% šķīduma sastāvdaļām**

Amonjaka 10% šķīdums nesatur citas aktīvas sastāvdaļas.

## **3. KĀ LIETOT AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMU**

Amonjaka 10% šķīdumu lieto inhalācijai un arīgi:

- Inhalācijai ģīboņa gadījumā dažus pilienus amonjaka šķīduma uzpilina uz kāda piesūcināma materiāla (vate, marle, kabatas lakats) un tuvina deguna ejām 0,5 – 1 sek, vienlaicīgi novērojot pacienta reakciju.
- Kukaiņu koduma vietas dezinfekcijai ādu ierīvē ar samitrinātu tamponu.

### **Ja esat lietojis Amonjaka 10% šķīdumu vairāk nekā noteikts**

Pārdozēšana iespējama, ja amonjaka tvaikus ieelpo ilgāk par ieteikto laiku: 0,5 – 1 sek. Tad novēro ķermeņa gļotādu kairinājuma pazīmes: acu gļotādas kairinājums rada asarošanu; elpošanas ceļu gļotādas pietūkuma dēļ kļūst apgrūtināta elpošana.

Pārdozēšana, arīgi lietojot, nav novērota. Ja rodas ādas kairinājuma pazīmes, nomazgā apziesto ādu ar ūdeni vismaz 5 min ilgi.

Ja nejauši Amonjaka 10% šķīdumu iedzer, rodas sārmu tipa ķīmiskais apdegums, kas izpaužas kā sāpes mutēs dobumā, rīklē, barības vadā un kuņģī. Tādā gadījumā nedrīkst lietot vemšanu veicinošas zāles, aktivēto ogli. Lai mazinātu zāļu koncentrāciju kuņģī, ieteicams iedzert 100 – 200 ml ūdens vai 0,5% citronskābes šķīdumu, vai 1% etiķskābes šķīdumu.

Pasākumi pārdozēšanas gadījumā: pārtrauc zāļu lietošanu, vēdina telpu vai slimnieku evakuē no amonjaka tvaikus saturošas telpas. Nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība.

### **Ja esat aizmirsis lietot Amonjaka 10% šķīdumu**

Nav attiecināms.

### **Ja Jūs pārtraucat lietot Amonjaka 10% šķīdumu**

Nav attiecināms.

## **4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Inhalējot tvaikus ģīboņa novēršanai, iespējamās ķermeņa gļotādas kairinošas reakcijas: acu asarošana, šķavas, klepus.

Ārīgi lietojot, iespējamās ādas sensibilizācijas reakcijas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

## 5. KĀ UZGLABĀT AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMU

Uzglabāt oriģināliepakojumā, cieši noslēgtu, temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Amonjaka 10% šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## 6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

### Ko Amonjaka 10% šķīdums satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 0.44 ml *Ammoniae solutio concentrata*.

Cita sastāvdaļa ir attīrīts ūdens.

### Amonjaka 10% šķīduma ārējais izskats un iepakojums

Amonjaka 10% šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar asu, raksturīgu smaržu.

Fasēts pa 40 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete.

### Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV1005

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa

2009. gada 27. novembrī