

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

IMUNOX pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Aktīvā viela ir Ehinācejas tinktūra (*Echinaceae tinctura*) 1:5

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.
- Ja pēc 3-5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir *Imunox* pilieni iekšķīgai lietošanai (turpmāk *Imunox*) un kādam nolūkam to lieto
2. Kas jāzina pirms *Imunox* lietošanas
3. Kā lietot *Imunox*
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt *Imunox*
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir *Imunox* un kādam nolūkam to lieto

Imunox (aktīvā viela ir Ehinācejas tinktūra) ir tradicionālas augu izcelsmes zāles, ko lieto kā palīg līdzekli saaukstēšanās gadījumā.

Šo zāļu lietošana minēto indikāciju gadījumā balstīta tikai uz ilgstošas lietošanas pieredzi.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas jāzina pirms *Imunox* lietošanas

Nelietojiet *Imunox* šādā gadījumā:

ja Jums ir alerģija pret Ehinācejas tinktūru un asteru dzimtas augiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms *Imunox* lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav ieteicams lietot, ja ir progresējoša sistēmiska slimība, piemēram, tuberkuloze, balto asins ķermenīšu slimības, kolagenozes, multiplā skleroze, AIDS, HIV infekcijas un citas imūnās sistēmas slimības.

Ja, zāles lietojot, slimības simptomi pastiprinās, parādās drudzis, Jums ir jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Jutīgiem pacientiem iespējamās alerģiskas reakcijas, tādēļ Jūs zāles varat lietot pēc konsultēšanās ar ārstu.

Ja Jums bijusi atopiska alerģija (kad reakcija parādās strauji – dažu minūšu laikā), Jūs varat lietot Ehinācejas tinktūru tikai pēc konsultēšanās ar ārstu, jo pastāv anafilaktiskā šoka risks.

No lietošanas jāatturas grūtniecēm, mātēm – zīdītājām, pacientiem ar smagām aknu slimībām vai epilepsiju.

Bērni un pusaudži

Bērniem līdz 12 gadu vecumam zāles lietot neiesaka, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošību.

Citas zāles un *Imunox*

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot.

Līdz šim negatīva mijiedarbība nav zināma.

***Imunox* kopā ar uzturu un dzērienu, un alkoholu**

Nav veikti pētījumi.

Grūtniecība un zīdīšanas periods, un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāļu lietošanas drošība grūtniecības un barošanas ar krūti laikā nav noteikta, tādēļ šajā periodā zāles neiesaka lietot.

Par ietekmi uz fertilitāti pētījumi nav veikti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, tomēr jāņem vērā, ka zāles satur 65 % etilspirtu.

***Imunox* satur etilspirtu**

Imunox satur 65 tilpuma % etilspirta (alkohola), t.i. 1 reizes devā (1 – 2 mililitros) ir 0,6 – 1,2 g etilspirta, kas atbilst aptuveni 12 - 24 ml 5% alus vai 5 –10 ml 12% vīna. Kaitīgs alkoholiķiem. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

3. Kā lietot *Imunox*

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar šo instrukciju vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita, vai medmāsas norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam, vai medmāsai.

Devas

Pusaudžiem, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem ieteicamā reizes deva ir 1 - 2 ml (45 – 90 pilieni) ko lieto 3 reizes dienā.

Lietošanas ilgums

Vēlams sākt lietot, tikko parādās pirmie saaukstēšanās simptomi.

Ja 10 dienu laikā saaukstēšanās simptomi nemazinās, slimniekam jāgriežas pie ārsta.

Lietošanas veids

Imunox lieto iekšķīgi.

Lietošana bērniem

Bērniem līdz 12 gadu vecumam neiesaka lietot (skat. 4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Ja esat lietojis *Imunox* vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot *Imunox*

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, bet ieņemiet parasto devu nākamajā reizē.

Ja Jūs pārtraucat lietot *Imunox*

Priekšlaicīga lietošanas pārtraukšana nelabvēlīgu ietekmi uz organismu neatstāj.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam, vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamās paaugstinātas jutības reakcijas (ādas reakcijas). To sastopamības biežums nav noteikts.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

5. Kā uzglabāt *Imunox*

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko *Imunox* satur

Aktīvā viela ir ehinācejas sakņu tinktūra (*Echinaceae tinctura*) 1:5 (ekstraģents: etilspirts 70 tilp.%).

***Imunox* ārējais izskats un iepakojums**

Imunox ir dzintardzeltens vai brūngandzeltens šķidrums ar raksturīgu smaržu un saldeni garšu.

Fasēts pa 40 ml tumša stikla pudelītē, kas noslēgta ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelītei uzlīmēta etiķete. Pudelīte ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika”,

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005

Telefons 67355550, 67355551. Fakss 67355551. e-pasts: inara@rff.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 19.06.2012