

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM  
**Kamparspirts RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums**  
*Camphora racemica*

**Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi).

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 5-7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Kamparspirts RFF un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Kamparspirta RFF lietošanas
3. Kā lietot Kamparspirtu RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Kamparspirtu RFF
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

## **1. KAS IR KAMPARSPIRTS RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**

Kamparspirts RFF ir uz ādas lietojams šķīdums. To lieto sāpīgu locītavu ierīvēšanai reimatoīdā artrīta gadījumā un ādas norīvēšanai izgulējumu profilaksei.

Kamparspirts pieder pie kairinošiem līdzekļiem ar tā saukto „atvelkošo” iedarbību: ja zāles ierīvē, ādas kairinājums reflektori rada vietēju asinsvadu paplašināšanos, radot siltuma un komforta sajūtu sāpošajās locītavās.

Ja ar kamparspirtu viegli apsmērē ādu, rodas vēsuma sajūta un mazinās nieze (izgulējumu profilakse).

## **2. PIRMS KAMPARSPIRTA RFF LIETOŠANAS**

**Nelietojiet Kamparspirtu RFF šādos gadījumos**

Ja Jums ir paaugstināta jutība pret kādu no zāļu sastāvdaļām.

Ja Jums ir vaļējas brūces, iekaisusi āda, apdegumi.

Nelietot nieru slimniekiem ar urīna izvades traucējumiem.

Nelietot grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā.

Nelietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Vienlaicīgi nedrīkst ierīvēt plašus ādas laukumus.

**Īpaša piesardzība, lietojot Kamparspirtu RFF, nepieciešama šādos gadījumos**

Pirms Kamparspirta RFF lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ilgstoši lietojot uz plašiem ādas laukumiem, iespējama kampara uzsūkšanās un var rasties saindēšanās pazīmes (skatīt apakšpunktu „Ja esat lietojis Kamparspirtu RFF vairāk nekā noteikts”).

Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutēs, dobumā un uz citām gļotādām. Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām, tās jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.

### **Bērni un pusaudži**

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

### **Citu zāļu lietošana**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

### **Kamparspirts RFF kopā ar uzturu**

Uzturs zāļu iedarbību neietekmē.

### **Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte**

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā Kamparspirtu RFF nedrīkst lietot.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Kamparspirts RFF neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

## **3. KĀ LIETOT KAMPARSPIRTU RFF**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Kamparspirts RFF ir uz ādas lietojams šķīdums.

Reimatoīdā artrīta gadījumā ādā virs locītavām ierīvē 2-5 ml (atkarībā no locītavu lieluma) 1-2 reizes dienā

Izgulējumu profilaksei parasti vakaros pirms gulētiešanas norīvē tos ķermeņa ādas rajonus, kas guļot balstīsies uz guļvietu. Smagiem slimniekiem var ierīvēt vairākas reizes dienā.

### **Lietošana bērniem un pusaudžiem**

Nedrīkst lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

### **Ja esat lietojis(-usi) Kamparspirtu RFF vairāk nekā noteikts**

Pārdozēšana, lietojot Kamparspirtu RFF ārīgi, nav novērota.

Ja konstatēts ādas kairinājums, nekavējoties zāles no ādas jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

Saindēšanās iespējama, ja zāles iedzer. Ja zāles iedzertas, novēro sliktu dūšu, vemšanu, kolikas, galvas sāpes, reiboni, karstuma sajūtu, neskaidru apziņu, murgus, epilepsijai līdzīgus krampjus, anuriju, komu. Slimnieka elpai ir raksturīgā kampara smarža.

Piemēram, 40 ml Kamparspirta RFF satur 800 mg tīras vielas, kas var būt bīstama bērnam, tādēļ zāles rūpīgi jāglabā no bērniem. Ja Jūs vai Jūsu bērns nejauši ir iedzēris kamparspirta šķīdumu, nekavējoties sazinieties ar tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu vai savu ārstu.

**Ja esat aizmirsis(-usi) lietot Kamparspirtu RFF**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

**4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Reti novērota kontaktekzēma. Iespējams ādas kairinājums (apsārtums, iekaisums). Lietojot ilgstoši uz plašiem ādas laukumiem, racēmiskais kampars var uzsūkties un var attīstīties saindēšanās pazīmes (skatīt apakšpunktu "Ja esat lietojis Kamparspirtu RFF vairāk nekā noteikts").

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv).

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

**5. KĀ UZGLABĀT KAMPARSPIRTU RFF**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Kamparspirtu RFF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

**6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA**

**Ko Kamparspirts RFF satur**

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 20 mg racēmiskā kampara (*Camphora racemica*).

Citas sastāvdaļas: 96% etilspirts, attīrīts ūdens.

**Kamparspirta RFF ārējais izskats un iepakojums**

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu kampara smaržu.

Fasēts pa 40 ml vai pa 90 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete. Ārējais iepakojums – kartona kastīte.

5 l (4,5 kg) šķīduma ABPE kannā (5 l) ar kopolimēra vāciņu.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV-1005, Latvija

Tel.: 67355550, 67355551

Fakss: 67355551

e-pasts: rff@rff.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 05/2016