

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

LUGOLA RFF 10 mg/g šķīdums lietošanai mutēs dobumā

Aktīvā viela: 1g šķīduma satur 10 mg joda (*Iodum*)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Lugola RFF 10 mg/g šķīdums rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 2 - 3 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Lugola RFF 10 mg/g šķīdums lietošanai mutēs dobumā un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas
3. Kā lietot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMS LIETOŠANAI MUTĒS DOBUMĀ UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Lugola RFF 10 mg/g šķīdumam piemīt dezinficējošas un antiseptiskas īpašības, ko nodrošina tā sastāvā esošais jods, kam piemīt izteiktas antibakteriālas, sporas iznīcinošas, pretsēnīšu un pretvīrusu īpašības.

Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu lieto mutēs dobumā.

Tas paredzēts kā palīglīdzeklis pie žāvas, mandeļu, rīkles gala un balsenes iekaisumiem.

2. PIRMS LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMA LIETOŠANAS

Nelietojiet Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu šādos gadījumos

Paaugstināta jutība pret kādu no zāļu sastāvdaļām.

Nelietot bērniem līdz 12 gadu vecumam un slimniekiem ar vairogdziedzera slimībām.

Nelietot grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā.

Sk. apakšpunktu „Citu zāļu lietošana”.

Īpaša piesardzība, lietojot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu nepieciešama šādos gadījumos
Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas laikā izmainās vairogdziedzera hormonu laboratoriskie rādītāji.

Jāizvairās no zāļu nejaušas iekļūšanas plaušās, jo sastāvā esošais glicerīns rada plaušu audu iekaisumu.

Zāles nerekomendē lietot ilgstoši (ilgāk kā 2 nedēļas).

Citu zāļu lietošana

Lugola RFF 10 mg/g šķīdums ir ķīmiski nesaderīgs ar amonjaku, sārmjiem, sārmzemju metālu karbonātiem, hlorālhidrātu, fenolu, nātrija tiosulfātu, dzīvsudraba un svina šķīstošiem sāļiem, tanīnu, cieti, terpentīnēļļu un lielāko daļu ēterisko eļļu, tādēļ tos nedrīkst lietot Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas laikā.

Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošana kopā ar uzturu

Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Tā kā trūkst pietiekamas pieredzes lietošanā, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu nevajadzētu lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lugola RFF 10 mg/g šķīdums neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. KĀ LIETOT LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMU

Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu lieto ieziešanai mutes dobumā.

Šķīdumā samitrina jodkociņu vai kosmētikas kociņu, ar ko apziež iekaisušās vietas: žāvu, mandeles, rīkles galu.

Šo procedūru atkārtoto 2-4 reizes dienā.

Ja esat lietojis Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu vairāk nekā noteikts

Lietojot mutes dobumā kā norādīts, pārdozēšana praktiski nav iespējama.

Ja esat aizmirsis lietot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu

Nelietojiet dubultu devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu

Lugola RFF 10 mg/g šķīdums ir tikai palīg līdzeklis iekaisumu ārstēšanai, tas nav paredzēts ilgstošai lietošanai.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles Lugola RFF 10 mg/g šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Reti iespējamās alergiskas reakcijas; ja nejauši šķīdums tiek ieelpots plaušās, iespējams plaušu audu iekaisums.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMU

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicāriet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Lugola RFF 10 mg/g šķīdums satur

- Aktīvā viela: 1 g šķīduma satur 10 mg joda (*Iodum*).
- Citas sastāvdaļas: Kālija jodīds, glicerīns, attīrīts ūdens.

Lugola RFF 10 mg/g šķīduma ārējais izskats un iepakojums

Lugola RFF 10 mg/g šķīdums ir sarkanbrūns, dzidrs, sīrupveidīgs šķidrums ar joda smaržu.

Fasēts pa 25 g tumša stikla pudelītē, kas aizvākota ar uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelītei uzlīmēta etiķete. Ārējais iepakojums – kartona kastīte.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"
Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV1005
Telefons 67355550, 67355551
Fakss 67355551
e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa

2009. gada 9. februārī