

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Menovazīns RFF uz ādas lietojams šķīdums

Mentholum racemicum, Procaini hydrochloridum, Benzocainum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Menovazīns RFF, uz ādas lietojams šķīdums, rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 5-7 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Menovazīns RFF, uz ādas lietojams šķīdums, un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Menovazīna RFF, uz ādas lietojama šķīduma, lietošanas
3. Kā lietot Menovazīnu RFF, uz ādas lietojamu šķīdumu
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Menovazīnu RFF, uz ādas lietojamu šķīdumu
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR MENOVAZĪNS RFF, UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS, UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Menovazīns RFF, uz ādas lietojams šķīdums ir arīgi lietojamas, kombinētas pretsāpju un pretniezes zāles. Sastāvā ietilpst mentols un vietējās anestēzijas līdzekļi prokaīns un benzokaīns, kam piemīt minētās īpašības.

Šķīdumu lieto nervu, muskuļu un locītavu sāpju mazināšanai, tai skaitā reimatoīdā artrīta gadījumos un ķermeņa ādas niezes mazināšanai dermatozu gadījumos.

2. PIRMS MENOVAZĪNA RFF, UZ ĀDAS LIETOJAMA ŠĶĪDUMA, LIETOŠANAS

Nelietojiet Menovazīnu RFF šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kādu no zāļu sastāvdaļām.

Nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam, grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā.

Īpaša piesardzība, lietojot Menovazīnu RFF, nepieciešama šādos gadījumos

Izvairīties no zāļu lietošanas uz vaļējām brūcēm, apdegumiem.

Nepieļaut zāļu nokļūšanu acīs un uz gļotādām.

Lietojot ilgstoši, var iekāist āda.

Nav ieteicams apstrādāt lielus ķermeņa ādas laukumus un lietot ilgstoši.

Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās pēc 5-7 dienu ilgas zāļu lietošanas, ir jāvēršas pie ārsta.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Neziest vienlaicīgi vai pārmaiņus ar sēru saturošām ziedēm.

Menovazīna RFF lietošana kopā ar uzturu

Menovazīna RFF āriņgās lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pierādīta zāļu pilnīga drošība grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā, tādēļ grūtniecības periodā un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, nedrīkst lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Menovazīns RFF, āriņgi lietojot, neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Svarīga informācija par kādu no Menovazīna RFF sastāvdaļām

Zāles satur 70 % etilspirta.

3. KĀ LIETOT MENOVAZĪNU RFF, UZ ĀDAS LIETOJAMU ŠĶĪDUMU

Menovazīnu RFF lieto āriņgi: 2-5 ml šķidruma (atkarībā no locītavu vai sāpošo, vai niezošo vietu lieluma) ierīvē ādā 2 - 3 reizes dienā.

Zāles nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Menovazīnu RFF vairāk nekā noteikts

Āriņgi lietojot, pārdozēšana praktiski nav iespējama.

Ja konstatēts ādas kairinājums, zāles nekavējoties jānomazgā no ādas ar ziepēm un ūdeni.

Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām (piemēram, acīs), jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Menovazīnu RFF

Nelietojiet dubultu devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Menovazīnu RFF

Menovazīns RFF ir tikai vietējas iedarbības sāpes vai niezi mazinošs līdzeklis, kas nav paredzēts ilgstošai lietošanai.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Menovazīns RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējams ādas kairinājums (apsārtums), nātrene, kontaktdermatīts, izsitumi, ādas pietūkums.

Atsevišķos gadījumos pēc ilgstošas zāļu lietošanas var būt galvas reibonis, vispārējs nespēks, arteriālā spiediena pazemināšanās; ļoti reti var rasties palielinātā daudzumā hemoglobīns, kas nepiesaista skābekli, kā rezultātā rodas ādas zilgana nokrāsa un aizdusa.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT MENOVAZĪNU RFF, UZ ĀDAS LIETOJAMU ŠĶĪDUMU

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot Menovazīnu RFF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot Menovazīnu RFF, ja pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Menovazīns RFF, uz ādas lietojams šķīdums, satur

Aktīvās vielas: 1 ml spirta šķīduma satur:

25 mg mentola racemiskā (*Mentholum racemicum*)

10 mg prokaīna hidrohlorīda (*Procaini hydrochloridum*)

10 mg benzokaīna (*Benzocainum*)

Citas sastāvdaļas: etilspirts 96 %, attīrīts ūdens.

Menovazīna RFF, uz ādas lietojama šķīduma, ārējais izskats un iepakojums

Menovazīns RFF ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums ar mentola smaržu.

Fasēts pa 40 ml vai pa 90 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu un PE ieliktni-blīvi ar drošības gredzenu.

Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju ievietota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S "RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA"

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija.

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

E-pasts: inara@rff.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

24.08.2009.

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa
2009. gada 24.augustā.