

## Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

### Streptocīda 10 % ziede

*Sulfanilamidum*

**Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 3-5 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir zāles Streptocīda ziede un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Streptocīda ziede lietošanas
3. Kā lietot zāles Streptocīda ziede
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt zāles Streptocīda ziede
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

#### **1. Kas ir zāles Streptocīda ziede un kādam nolūkam tās lieto**

Zāles Streptocīda ziede ir sulfanilamīdu grupas preparāts, kas paredzēts lietošanai uz ādas. Aptur ādas infekciju (sastrutojumu) izraisošu baktēriju vairošanos. Lieto ādas infekciju ārstēšanai, ko izsauc minētās baktērijas.

Ja pēc 3-5 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

#### **2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Streptocīda ziede lietošanas**

**Nelietojiet zāles Streptocīda ziede šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret sulfanilamīdu vai sulfanilamīda grupas zālēm;
- bērniem līdz 12 gadu vecumam;
- ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

#### **Brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

Pirms zāļu Streptocīda ziede lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Lietojiet pārsēju, lai novērstu iespējamo ādas paaugstinātu jutīgumu pret gaismu (fotosensibilizāciju).

Ādas alerģiskas reakcijas gadījumā ziedi nekavējoties nomazgājiet ar tīru ūdeni.

#### **Citas zāles un Streptocīda 10 % ziede**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot uz ādas, mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.

### **Streptocīda 10 % ziede lietošana kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu**

Nav datu par uztura, dzērienu un alkohola ietekmi uz zāļu lietošanas efektivitāti un drošumu.

### **Grūtniecība un barošana ar krūti**

Zāļu lietošanas drošība grūtniecības laikā nav pārbaudīta, tādēļ grūtniecības un barošanas ar krūti periodā to lietot nedrīkst (skatīt 4.3. apakšpunktu).

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

## **3. Kā lietot zāles Streptocīda ziede**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles Streptocīda ziede ir paredzētas lietošanai uz ādas.

*Pusaudži no 12 gadu vecuma, pieaugušie un gados vecāki cilvēki*

1-2 reizes dienā inficēto ādas rajonu (brūci, čūlu) rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet. Uzliediet zāles plānā kārtā uz infekcijas skartajām ādas zonām. Apsaitējiet, lai novērstu iespējamo ādas paaugstinātu jutīgumu pret gaismu (fotosensibilizāciju).

Kad brūce sadzijusi, pārtrauciet lietošanu.

Ja, pēc 3-5 dienām ilgas zāļu lietošanas, simptomi saglabājas vai pastiprinās, Jums jākonsultējas ar ārstu.

### **Lietošana bērniem un pusaudžiem**

Zāles Streptocīda ziede nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošumu.

### **Ja esat lietojis zāles Streptocīda ziede vairāk nekā noteikts**

Lietojot lokāli uz ādas, pārdozēšana maz iespējama. Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

### **Ja esat aizmirsis lietot zāles Streptocīda ziede**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

### **Ja Jūs pārtraucat lietot zāles Streptocīda ziede**

Priekšlaicīga lietošanas pārtraukšana var netieši veicināt brūcē esošo baktēriju vairošanos un sastrutojuma palielināšanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

## **4. Iespējamās blakusparādības**

Tāpat kā visas zāles, Streptocīda ziede var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Šajos gadījumos lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

*Reti* (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

- ādas alerģiska reakcija;
- nieze.

*Ļoti reti* (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

- dermatīts;
- Stīvensa-Džonsona sindroms;
- paaugstināts ādas jutīgums pret gaismu (ja brūci neapsaitē).

#### Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv). Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

### **5. Kā uzglabāt zāles Streptocīda ziede**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbas pēc „Derīgs līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

### **6. Iepakojuma saturs un cita informācija**

#### **Ko zāles Streptocīda ziede satur**

Aktīvā viela: sulfanilamīds. 1 g ziedes satur 100 mg sulfanilamīda.

Citas sastāvdaļas: vazelīns.

#### **Zāļu Streptocīda ziede ārējais izskats un iepakojums**

Ziede ir baltā vai iedzeltenā krāsā.

30 g ziedes alumīnija tūbā, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu.

Tūba kopā ar lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

#### **Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

A/S “Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija

Telefons: 67355550, 67355551

Fakss: 67355551

E-pasts: [rff@rff.lv](mailto:rff@rff.lv)

**Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 11/2016**