

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Ūdeņraža peroksīds RFF 3% šķīdums *Hydrogenii peroxidum*

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits, vai medmāsa.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 2 dienām nejutāties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir *Ūdeņraža peroksīds RFF 3% šķīdums* (turpmāk tekstā "Ūdeņraža peroksīds RFF") un kādam nolūkam to lieto
2. Kas jāzina pirms Ūdeņraža peroksīda RFF lietošanas
3. Kā lietot Ūdeņraža peroksīdu RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Ūdeņraža peroksīdu RFF
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDS RFF un KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Ūdeņraža peroksīdu, tam saskaroties ar audiem, šķeļ audu ferments katalāze, atbrīvojot molekulāro skābekli, kas kā oksidētājs nodrošina tā dezinficējošās (baktericīdās) un dezodorējošās īpašības.

Visbiežāk izmanto ūdeņraža peroksīda mehāniskās jeb nesēja īpašības: skābeklis izdaloties veido gāzes pūslīšus un putas, kas no brūcēm paceļ uz augšu svešķermeņu, strutu u.c. daļiņas, kas tūlīt jānoslauka.

Ūdeņraža peroksīda šķīdumu lieto arī:gi:

- 3% šķīdumu lieto netīru un strutainu brūču un čūlu mehāniskai attīrīšanai un dezinfekcijai.
- 1.5% jeb 15 mg/ml šķīdumu - akūta stomatīta, mutes dobuma strutainu brūču un zobu sakņu kanālu mehāniskai attīrīšanai, dezinfekcijai un dezodorēšanai.
- Ar Ūdeņraža peroksīda RFF 3% šķīdumu var atbrīvot ādas bojājuma vietu no pielipuša, sakaltuša pārsēja vai apģērba.

2. KAS JĀZINA PIRMS ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDA RFF LIETOŠANAS

Nelietojiet Ūdeņraža peroksīdu RFF šādos gadījumos

Ja Jums ir

- paaugstināta jutība pret ūdeņraža peroksīdu.
- dziļa brūce, vai slēgtu ķermeņa dobumu apstrādei, lai izslēgtu iespējamo embolijas parādīšanos.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ūdeņraža peroksīda RFF lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu.

Ilgstoši lietojot mutes dobuma skalošanai, var rasties mēles kārpīņu hipertrofija vai tikt kairināta mutes dobuma gļotāda. Šīs parādības izzūd pēc skalošanas pārtraukšanas.

Lietojot mutes un rīkles skalošanai, skalojamo šķīdumu nevajag norīt, bet izspļaut.

Citas zāles un Ūdeņraža peroksīds RFF

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ūdeņraža peroksīdu RFF nevar lietot vienlaicīgi ar reducējošām vielām, arī organiskas dabas; oksidētājiem, sārmim, jodīdiem, permanganātiem. Tā sadalīšanos veicina metālu sāļi, gaisma, sakratišana, karsēšana, metālu klātbūtne.

Ūdeņraža peroksīds RFF ir salīdzinoši stabils nelielu skābes palieku klātbūtnē.

Nevajadzētu lietot kopā ar krēmiem, ziedēm un citiem lokāli lietojamiem šķīdumiem.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, vai, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pierādīta zāļu pilnīga drošība grūtniecības un barošanas ar krūti laikā, tādēļ grūtniecības periodā un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, Ūdeņraža peroksīdu RFF nevajadzētu lietot.

Nav veikti pētījumi par ūdeņraža peroksīda ietekmi uz pēcnācēju radīšanu (fertilitāti).

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ūdeņraža peroksīds RFF, lietojot arī, neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Svarīga informācija par kādu no Ūdeņraža peroksīda RFF sastāvdaļām

Ūdeņraža peroksīds RFF satur nātrija benzoātu, kas ir vājš ādas, acu un gļotādu kairinātājs.

3. KĀ LIETOT ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDU RFF

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits, vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam, vai medmāsai.

Ūdeņraža peroksīdu RFF lieto arī.

Ieteicamā deva ir individuāla, atkarībā no brūces lieluma: uz visu brūci uzlej nedaudz Ūdeņraža peroksīdu RFF. Pēc putu rašanās tās noslauka ar sterilu pārsienamo materiālu. Šo procedūru atkārtoto vairākas reizes, kamēr brūce tīra.

Mutes dobuma skalošanai Ūdeņraža peroksīdu RFF 3% šķīdumu atšķaida attiecībās 1:1 ar novārītu un atdzesētu ūdeni, lai iegūtu 1.5% šķīdumu.

Lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam

Ūdeņraža peroksīds RFF nav ieteicams lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošību.

Ja esat lietojis Ūdeņraža peroksīdu RFF vairāk nekā noteikts

Ārīgi lietojot, Ūdeņraža peroksīda RFF 3% un 1,5% šķīduma pārdozēšana ir praktiski neiespējama.

Lielākas koncentrācijas šķīdums var apdedzināt audus un gļotādas, radot niezošus apdegumus ar baltu kreveli, kas pazūd apmēram stundas laikā.

Ja esat aizmirsis lietot Ūdeņraža peroksīdu RFF

Nelietojiet dubultu devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ūdeņraža peroksīdu RFF

Ūdeņraža peroksīds RFF ir tikai palīg līdzeklis brūces iztīrīšanai, tas nav paredzēts ilgstošai lietošanai.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ilgstoši lietojot mutes dobuma skalošanai, var rasties mēles kārpīņu hipertrofija vai tikt kairināta mutes dobuma gļotāda. Šīs parādības izzūd pēc skalošanas pārtraukšanas.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT ŪDENRAŽA PEROKSĪDU RFF

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un kontakta ar organiskām vielām.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Ūdenraža peroksīdu RFF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Ūdenraža peroksīds RFF satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 30 mg ūdenraža peroksīda (*Hydrogenii peroxidum*)

Citas sastāvdaļas: nātrijs benzoāts, attīrīts ūdens.

Ūdenraža peroksīda RFF ārējais izskats un iepakojums

Ūdenraža peroksīds RFF ir bezkrāsains, dzidrs šķidrums bez smaržas.

Fasēts pa 100 ml gaismas necaurlaidīgā plastmasas pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorki un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete un pievienota lietošanas instrukcija.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S "Rīgas farmaceutiskā fabrika"

Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV 1005

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

e-pasts: rff@rff.lv