

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

VILKĀBEĻU ŠĶIDRAIS EKSTRAKTS RFF, pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Aktīvā viela ir Vilkābeļu augļu šķidrās ekstrakts (*Crataegi extractum fluidum*) 1:1

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes, tomēr Jums jālieto Vilkābeļu šķidrās ekstrakts RFF rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Vilkābeļu šķidrās ekstrakts un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Vilkābeļu šķidrās ekstrakta lietošanas
3. Kā lietot Vilkābeļu šķidro ekstraktu
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt šķidro ekstraktu
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR VILKĀBEĻU ŠĶIDRAIS EKSTRAKTS RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Vilkābeļu šķidrās ekstrakts ir augu izcelsmes zāles. Tās rada simptomātisku atvieglojumu tādos sirdsdarbības traucējumu gadījumos kā paātrināta sirds darbība un/vai paaugstināts asinsspiediens.

To lieto I-II. funkcionālas klases sirds mazspējas pēc NYHA klasifikācijas gadījumos.

Vilkābeļu tinktūrā esošās aktīvās vielas iedarbojas spēcinoši uz sirdi, paplašina asinsvadus un pazemina arteriālo asinsspiedienu.

2. PIRMS VILKĀBEĻU ŠĶIDRĀ EKSTRAKTA RFF LIETOŠANAS

Nelietojiet Vilkābeļu šķidro ekstraktu šādā gadījumā

- ja Jums ir paaugstināta jutība pret vilkābeļu augļiem vai etilspirtu.

Īpaša piesardzība, lietojot Vilkābeļu šķidro ekstraktu, nepieciešama šādos gadījumos

- Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās pēc zāļu lietošanas, ir jāvērsas pie ārsta.
- Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam zāles lietot nerekomendē ierobežotas pieredzes dēļ.

Vilkābeļu šķidrās ekstrakts satur 55 tilpuma % etilspirta (alkohola), t.i. 1 reizes devā (20 – 30 pilienos) ir 220-330 mg etilspirta, kas atbilst 4,4-6,6 ml (1 tējkarote = 5 ml) alus (5%) vai 2,75-4,6 ml vīna (12%), tādēļ piesardzīgi jālieto pacientiem – alkoholiķiem, slimniekiem ar aknu slimībām un epilepsiju.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Lietojot vienlaicīgi ar sirdslīdzekļiem un/vai asinsspiedienu pazeminošām zālēm, iespējams, ka nepieciešama devu korekcija.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pierādīta zāļu pilnīga drošība grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā, tādēļ grūtniecības periodā un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, nedrīkst lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vilkābeļu šķidrās ekstrakts neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija

Vilkābeļu šķidrās ekstrakts satur 55 tilpuma % etilspirta (alkohola), t.i. 1 reizes devā (20 – 30 pilienos) ir 220-330 mg etilspirta, kas atbilst 4,4-6,6 ml (1 tējkarote = 5 ml) alus (5%) vai 2,75-4,6 ml vīna (12%), tādēļ piesardzīgi jālieto pacientiem – alkoholiķiem, slimniekiem ar aknu slimībām un epilepsiju.

3. KĀ LIETOT VILKĀBEĻU ŠĶIDRO EKSTRAKTU RFF

Vienmēr lietojiet Vilkābeļu šķidro ekstraktu tieši tā, kā ārsts Jums ir stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles lieto iekšķīgi.

Vilkābeļu šķidrās ekstrakts nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošību.

Pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem ieteicamā reizes deva ir 20-30 pilieni, ko lieto 2-3 reizes dienā; sirdsklauvju gadījumā var lietot epizodiski, sirds mazspējas gadījumā – ilgstoši (pastāvīgi).

Maksimālā dienas deva: 4 reizes devas.

Ja esat lietojis Vilkābeļu šķidro ekstraktu vairāk nekā noteikts

Zāļu pārdozēšanas gadījumi nav novēroti.

Ja esat aizmirsis lietot Vilkābeļu šķidro ekstraktu

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Vilkābeļu šķidrās ekstrakts var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos novērota slikta dūša, nogurums, svīšana, izsitumi uz rokām.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT VILKĀBEĻU ŠĶIDRO EKSTRAKTU RFF

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Vilkābeļu šķidro ekstraktu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc "Derīgs līdz: ". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot Vilkābeļu šķidro ekstraktu, ja pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiēt farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Vilkābeļu šķidrās ekstrakts satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 1 ml Vilkābeļu augļu šķidrās ekstrakta (*Crataegi extractum fluidum*) 1:1 (ekstraģents: etilspirts 70 tilpuma %).

Palīgvielu nav.

Vilkābeļu šķidrās ekstrakta ārējais izskats un iepakojums

Vilkābeļu šķidrās ekstrakts ir brūns vai sarkanbrūns šķidrums ar patīkamu smaržu un saldenu garšu. Uzglabāšanas laikā pieļaujamas nelielas duļķes un nogulsnes.

Fasēts pa 25 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete. Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/s „Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija

Telefons: 67355550, 6355551

Fakss: 67355551

e-pasts: rff@rff.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

05.02.2014.

*A/s RFF Kvalificētā persona D. Āboltiņa
2014. g. 5. februārī*