

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 20 mg salicilskābes (*Acidum salicylicum*)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu* rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 2 nedēļām, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums* un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma* lietošanas
3. Kā lietot *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu*
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu*
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums ir ieteicams pinņu ārstēšanai.

Pinnes ir hroniski noritoša ādas slimība, kas skar tauku dziedzerus. Salicilskābei piemīt pinņu šķīdinošas īpašības. To lieto gan melno (komedonu), gan balto, gan juvenīlo (jaunības) pinņu ārstēšanai. Visatzītākais *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma* pielietojums ir tieši melnās pinnes.

2. PIRMS SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMA ŠĶĪDUMA LIETOŠANAS

Nelietojiet *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu* šādos gadījumos

Ja Jums ir:

- iekaisusi āda un vaļējas brūces,
- grūtniecība un zīdīšanas periods,
- Vienlaicīgi nedrīkst apziest plašus ādas laukumus, īpaši tas jāievēro hemofilijas un asins recēšanas sistēmas traucējumu gadījumā,
- Ja ir zināma paaugstināta jutība pret aspirīnu un citiem nesteroidiem pretiekaisuma līdzekļiem (t.i. šīs zāles izsaukušas astmas lēkmi, nātreni, alerģiskas iesnas, tūsku).

Īpaša piesardzība, lietojot *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu*, nepieciešama šādos gadījumos

Ilgstoši lietojot uz plašiem ādas laukumiem, salicilskābei uzsūcoties, var rasties saindēšanās pazīmes (skat. apakšpunktu „Ja esat lietojis *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu* vairāk nekā noteikts”).

- Sakarā ar salicilskābes viegļu kairinošu iedarbību var rasties ādas iekaisums.
- Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutēs, dobumā un uz citām gļotādām.
- Smagu aknu un nieru slimību gadījumā drīkst apziest tikai mazus ādas laukumus.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Ķīmiski salicilskābe ir nesavienojama ar jodu, dzelzs sāļiem un oksidējošām vielām.

***Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma* lietošana kopā ar uzturu**

Uzturs zāļu iedarbību neietekmē.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu* nedrīkst lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums* neietekmē.

Svarīga informācija par kādu no *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma* sastāvdaļām

Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums satur apmēram 70 % etilspirta.

3. KĀ LIETOT SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMU ŠĶĪDUMU

Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu lieto ārīgi.

Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu nedrīkst lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Piņņu gadījumā apziest bojātās vietas 2-3 reizes dienā.

Ja esat lietojis *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu* vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana, lietojot *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu*, novērota ļoti reti. Saindēšanās gadījumā pirmās rodas elpošanas izmaiņas: paātrināta jeb pastiprināta elpošana, kas pāriet elpošanas nomākumā. Vieglas saindēšanās gadījumā novēro sliktu dūšu, vemšanu, galvas reiboni un džinkstēšanu ausīs. Smaga saindēšanās izpaužas ar apjukumu, miegainību, asinsspiediena pazemināšanos, krampjiem, urīna izdales pārtraukumu un asiņošanu no gremošanas trakta.

Tad zāļu lietošana jāpārtrauc, jānomazgā apziestā āda un jākonsultējas ar ārstu par tālāko rīcību.

Ja esat aizmirsis lietot *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu*

Nākamajā lietošanas reizē devu nedubultojiet.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums* var izraisīt blakusparādības:

āda var kļūt sausa, rasties nieze, kairinājuma vai dedzināšanas sajūta, apsārtums.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMU ŠĶĪDUMU

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu* pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu*, ja pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiert farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko *Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums* satur

Aktīvā viela ir salicilskābe.

Citas sastāvdaļas ir 96% etilspirts, attīrīts ūdens.

***Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma* ārējais izskats un iepakojums**

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar etilspirta smaržu.

Fasēts pa 40 ml vai pa 90 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Ārējais iepakojums – kartona kastīte.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV1005 Latvija

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

E-pasts: inara@rff.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

24.08.2009.

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa
2009. gada 24. augustā.