

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

VILKĀBEĻU TINKTŪRA RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Aktīvā viela ir Vilkābeļu augļu tinktūra (*Crataegi tinctura*) 1:10

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes, tomēr Jums jālieto Vilkābeļu tinktūra RFF rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis neuzlabojas, Jums jāsaņemas ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Vilkābeļu tinktūra un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Vilkābeļu tinktūras lietošanas
3. Kā lietot Vilkābeļu tinktūru
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Vilkābeļu tinktūru
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR VILKĀBEĻU TINKTŪRA RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Vilkābeļu tinktūra ir augu izcelsmes zāles.

Tās rada simptomātisku atvieglojumu tādos sirdsdarbības traucējumu gadījumos kā paātrināta sirds darbība un/vai paaugstināts asinsspiediens.

To lieto I-II. funkcionālas klases sirds mazspējas (pēc NYHA klasifikācijas) gadījumos.

Vilkābeļu tinktūrā esošās aktīvās vielas iedarbojas spēcinoši uz sirdi, paplašina asinsvadus un pazemina arteriālo asinsspiedienu.

2. PIRMS VILKĀBEĻU TINKTŪRAS RFF LIETOŠANAS

Nelietojiet Vilkābeļu tinktūru šādā gadījumā

ja Jums ir paaugstināta jutība pret vilkābeļu augļiem vai etilspirtu.

Īpaša piesardzība, lietojot Vilkābeļu tinktūru, nepieciešama šādos gadījumos

Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās pēc zāļu lietošanas, ir jāvēršas pie ārsta.

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam zāles lietot nerekomendē ierobežotas pieredzes dēļ.

Vilkābeļu tinktūra satur 65 tilpuma % etilspirta (alkohola), t.i. 1 reizes devā (20 – 30 pilienos) ir 220-330 mg etilspirta, kas atbilst 4,4-6,6 ml (1 tējkarote = 5 ml) alus (5%) vai 2,75-4,6 ml vīna (12%), tādēļ piesardzīgi jālieto pacientiem – alkoholiķiem, slimniekiem ar aknu slimībām un epilepsiju.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Lietojot vienlaicīgi ar sirdslīdzekļiem un/vai asinsspiedienu pazeminošām zālēm, iespējams, ka nepieciešama devu korekcija.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pierādīta zāļu pilnīga drošība grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā, tādēļ grūtniecības periodā un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, nedrīkst lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vilkābeļu tinktūra neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija

Vilkābeļu tinktūra satur 65 tilpuma % etilspirta (alkohola), t.i. 1 reizes devā (20 – 30 pilienos) ir 220-330 mg etilspirta, kas atbilst 4,4-6,6 ml (1 tējkarote = 5 ml) alus (5%) vai 2,75-4,6 ml vīna (12%), tādēļ piesardzīgi jālieto pacientiem – alkoholiķiem, slimniekiem ar aknu slimībām un epilepsiju.

3. KĀ LIETOT VILKĀBEĻU TINKTŪRU RFF

Vienmēr lietojiet Vilkābeļu tinktūru tieši tā, kā ārsts Jums ir stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles lieto iekšķīgi.

Vilkābeļu tinktūra nav ieteicama lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošību.

Pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem ieteicamā reizes deva ir 20-30 pilieni, ko lieto 2-3 reizes dienā; sirdsklauvju gadījumā var lietot epizodiski, sirds mazspējas gadījumā – ilgstoši (pastāvīgi).

Maksimālā dienas deva: 4 reizes devas.

Ja esat lietojis Vilkābeļu tinktūru vairāk nekā noteikts

Zāļu pārdozēšanas gadījumi nav novēroti.

Ja esat aizmirsis lietot Vilkābeļu tinktūru

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Vilkābeļu tinktūra var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos novērota slikta dūša, nogurums, svīšana, izsitumi uz rokām.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT VILKĀBEĻU TINKTŪRU RFF

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Vilkābeļu tinktūru pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc “Derīgs līdz: ”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot Vilkābeļu tinktūru, ja pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Vilkābeļu tinktūra satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 1 ml vilkābeļu augļu tinktūras (*Crataegi tinctura*) 1:10 (ekstraģents: etilspirts 70 tilpuma %).
Palīgvielu nav.

Vilkābeļu tinktūras ārējais izskats un iepakojums

Vilkābeļu tinktūra ir dzeltenbrūns šķidrums ar saldenu garšu. Uzglabāšanas laikā pieļaujamas nelielas duļķes un nogulsnes.

Fasēta pa 25 ml vai 90 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete. Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/s „Rīgas farmaceitiskā fabrika”
Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija
Telefons: 67355550, 6355551
Fakss: 67355551
e-pasts: rff@rff.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

05.02.2014.

*A/s RFF Kvalificētā persona D. Āboltiņa
2014. g. 5. februārī*